

Kurzanleitung

zur Anwendung von Ganirelix Theramex

Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformation (Packungsbeilage), um alle Einzelheiten zur Anwendung von Ganirelix Theramex zu erfahren.



ganirelix theramex

Anwendung von Ganirelix Theramex

Dieses Arzneimittel wird im Rahmen der assistierten Reproduktionsmedizin (ART) eingesetzt, einschließlich der In-vitro-Fertilisation (IVF).

Sie werden sich die Injektionen selbst verabreichen, nachdem Ihr Arzt Ihnen erklärt hat, was Sie tun müssen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie die Anweisungen nicht verstanden haben.

Schritt 1

Die Stimulation der Follikel mit follikelstimulierendem Hormon (FSH) kann an Tag 2 oder 3 Ihrer Periode beginnen.

Schritt 2


Der Inhalt der Fertigspritze Ganirelix Theramex (0,25 mg) sollte 1-mal täglich direkt unter die Haut injiziert werden, beginnend am 5. oder 6. Tag der FSH-Stimulation. Unter Berücksichtigung Ihrer ovariellen Reaktion entscheidet Ihr Arzt möglicherweise, an einem anderen Tag zu beginnen. Ganirelix Theramex und FSH sollten

annähernd zur selben Zeit verabreicht werden. Da die Präparate nicht gemischt werden dürfen, müssen sie an verschiedenen Stellen injiziert werden. Die tägliche Behandlung mit Ganirelix Theramex sollte bis zu dem Tag fortgesetzt werden, an dem ausreichend Follikel entsprechender Größe vorhanden sind.

Schritt 3

Die endgültige Reifung der Eizellen in den Follikeln kann durch die Gabe von humanem Choriongonadotropin (hCG) eingeleitet werden. Die Zeitspanne zwischen zwei Ganirelix Theramex-Injektionen bzw. zwischen der letzten Ganirelix Theramex-Injektion und der hCG-Injektion sollte nicht mehr als 30 Stunden betragen, da es sonst zu einem vorzeitigen Eisprung (Freisetzen der Eizellen) kommen kann. Wenn Sie sich Ganirelix Theramex immer morgens

verabreichen, sollten Sie sich Ganirelix Theramex auch an dem Morgen verabreichen, an dem die hCG-Behandlung zur Auslösung des Eisprungs durchgeführt wird. Wenn Sie sich Ganirelix Theramex immer nachmittags verabreichen, sollten Sie sich die letzte Gabe Ganirelix Theramex am Nachmittag vor dem Tag, an dem der Eisprung ausgelöst wird, verabreichen.



FSH



Hinweise zur Handhabung

1. Injektionsstelle


Ganirelix Theramex erhalten Sie in einer Fertigspritze, die eine Dosis enthält. Der Inhalt sollte langsam direkt unter die Haut injiziert werden, vorzugsweise in den Oberschenkel. Kontrollieren Sie die Lösung vor Gebrauch. Verwenden Sie sie nicht, wenn die Lösung Teilchen enthält oder nicht klar ist. Wenn Sie sich die Injektionen selbst oder Ihr Partner Sie Ihnen verabreicht, sollten Sie den nachstehenden Anweisungen genau folgen. Mischen Sie Ganirelix Theramex nicht mit anderen Arzneimitteln.

2. Vorbereitung der Injektionsstelle

Waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Wasser und Seife. Wischen Sie die Injektionsstelle mit einem Desinfektionsmittel (z.B. Alkohol) ab, um Bakterien von der Hautoberfläche zu entfernen. Desinfizieren Sie etwa 5 cm um die vorgesehene Einstichstelle. Lassen Sie das Desinfektionsmittel mindestens 1 Minute lang trocknen, bevor Sie fortfahren.

3. Nadeleinstich

Entfernen Sie den Nadelschutz. Nehmen Sie die gereinigte Hautfläche zwischen Daumen und Zeigefinger, um eine Falte zu bilden. Stechen Sie die Nadel ungefähr in einem Winkel von 45° zur Hautoberfläche unten in die Hautfalte. Verwenden Sie für jede Injektion eine andere Stelle.



4. Überprüfung der Nadelposition

Ziehen Sie den Kolben leicht zurück, um zu überprüfen, ob die Nadel richtig positioniert ist. Wird dabei Blut in die Spritze aufgezogen, so hat die Nadelspitze ein Blutgefäß verletzt. In diesem Fall injizieren Sie Ganirelix Theramex nicht. Ziehen Sie die Spritze heraus und drücken Sie mit einem Desinfektionstopfer auf die Injektionsstelle; die Blutung sollte innerhalb von 1 oder 2 Minuten zum Stillstand kommen. Verwenden Sie diese Spritze nicht mehr und entsorgen Sie diese ordnungsgemäß. Beginnen Sie mit einer neuen Spritze.


5. Injektion der Lösung

Sobald die Nadel richtig positioniert ist, drücken Sie den Kolben langsam und gleichmäßig herunter. Dadurch wird die Lösung korrekt injiziert und die Haut nicht verletzt.

6. Entfernen der Spritze

Ziehen Sie die Spritze rasch heraus. Drücken Sie mit einem Desinfektionstopfer auf die Injektionsstelle. Benutzen Sie die Fertigspritze nur einmal.

Wenn Sie eine größere Menge Ganirelix Theramex angewendet haben, als Sie sollten, wenden Sie sich an Ihren Arzt.



7. Wenn Sie die Anwendung von Ganirelix Theramex vergessen haben

Wenn Sie feststellen, dass Sie die Injektion einer Dosis vergessen haben, holen Sie diese umgehend nach.

Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Sollten Sie mehr als 6 Stunden zu spät sein, sodass die Zeitspanne zwischen zwei Injektionen mehr als 30 aStunden beträgt, dann holen Sie diese so bald wie möglich nach und fragen Sie Ihren Arzt um Rat.

8. Wenn Sie die Anwendung von Ganirelix Theramex abbrechen

Brechen Sie die Anwendung von Ganirelix Theramex nicht ab, es sei denn, Ihr Arzt hat Ihnen dazu geraten, da dies den Behandlungserfolg beeinträchtigen kann.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal.

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal.



www.theramex.com



ganirelix theramex