



Therapieanleitung Kryotransfer mit Gynokadin

1. Zyklusstart

Bitte informieren Sie uns über Ihren Blutungsstart (= 1. Zyklustag) - spätestens am 3. Blutungstag!! Als erster Zyklustag wird der Tag gewertet, an dem die Periodenblutung „richtig“ einsetzt. Schmierblutungen/bräunlicher Ausfluss zählen nicht als Zyklusbeginn.

Sie erreichen uns a) per eMail: info@kinderwunschpraxis-muenchen-nord.de
b) über's Telefon: 089/ 4523545-0
c) per Fax 089/ 4523545-45

2. erste Zyklushälfte:

Bitte tragen Sie **ab dem 2.Zyklustag** täglich 4 Hübe (2-0-2) **Gynokadin Gel** auf die Haut auf und steigern Sie die Dosis **ab dem 7.Zyklustag** auf täglich 6 Hübe (3-0-3) **Gynokadin Gel**.

Das Gynokadin Gel muss durchgehend bis zum Schwangerschaftstest angewendet werden!

Lassen Sie am **10. Zyklustag** in unserer Praxis oder bei Ihrem Frauenarzt eine Ultraschalluntersuchung durchführen. Anhand dieser Ergebnisse kann der Zeitpunkt für das Auftauen der befruchteten Eizellen/ Embryonen, für den Embryotransfer und für den Beginn von Utrogest festgelegt werden.

3. Embryotransfer

Für den Embryotransfer kommen Sie bitte mit gefüllter Blase in die Praxis (mind. 1 h vor dem Transfer nicht mehr auf die Toilette gehen). An diesem Morgen soll Utrogest (s.u.) ausnahmsweise nicht in die Scheide eingeführt sondern oral angewendet = geschluckt werden.

4. zweite Zyklushälfte

Führen Sie bitte nach Anweisung der Praxis bis zum Schwangerschaftstest (Ausnahme: Tag des Embryotransfers, s.o.) 3 mal täglich (morgens, mittags, abends) 1 Kapsel **Utrogest** in die Scheide ein. Es ist typisch, dass sich die Kapseln nicht ganz auflösen und Reste der Trägersubstanz wieder aus der Scheide heraus kommen.

Utrogest enthält das Hormon Progesteron, welches wichtig für die Einnistung des Embryos ist. Es wird seit sehr vielen Jahren in der Kinderwunschbehandlung erfolgreich eingesetzt. Die vaginale Anwendung ist hoch wirksam und hat sehr wenige Nebenwirkungen.

Die zweite Zyklushälfte ist als Wartezeit auf den Schwangerschaftstest eine schwierige Zeit; Sie hoffen und Sie bangen. In dieser Zeit möchten wir Sie nicht alleine lassen. Hier ein paar Tipps, wie Sie die 2. Zyklushälfte unterstützen können:

Wir empfehlen bereits vor Eintritt der Schwangerschaft die Einnahme von 400 µg **Folsäure** und 150µg **Jod** täglich.

Rauchen in der Schwangerschaft schadet dem Embryo. Reduzieren Sie Ihren Zigarettenkonsum, oder hören Sie am Besten ganz auf.

Verzichten Sie auf Alkohol in der Schwangerschaft, da es dadurch zu Fehlbildungen des Kindes kommen kann.

Sie können Ihr Leben ansonsten ganz normal weiter führen: Sport, Bewegung allgemein, Flugreisen, Autofahrten, Geschlechtsverkehr, Kaffee und Tee in Maßen, Duschen, Baden und auch der Besuch beim Frisör ist erlaubt. Versuchen Sie sich gut abzulenken!

Haben Sie Fragen, Wünsche oder Sorgen, so melden Sie sich gerne bei uns. Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

5. Schwangerschaftstest

Bitte machen Sie an dem von uns genannten Tag einen Schwangerschaftstest aus dem ersten Morgenurin.

Bitte beachten Sie dabei folgendes: Urin-Tests sind nicht so zuverlässig wie die Blutuntersuchung und können auch „negativ“ anzeigen, obwohl doch eine Schwangerschaft besteht – gerade wenn gleichzeitig eine Blutung auftritt. Dann kann durchaus eine **Eileiterschwangerschaft** vorliegen, welche für Sie gefährlich werden kann, wenn sie nicht erkannt wird.

Informieren Sie uns daher immer (egal ob positiv oder negativ) per Email über das Ergebnis. Dann besprechen wir mit Ihnen das weitere Vorgehen.